



Hesta Plus Kopper, 1 kg

Konstatering av näringsbrist

Veterinären kan fastställa en näringsbrist genom ett blodprov. Vissa brister kan bestämmas genom en håranalys, andra helt enkelt med hjälp av det tränade ögat!

Tidiga tecken på näringsbrist visar sig på följande sätt:

- päls- och hudförändringar
- förändringar i hovstrukturen
- spänningar i muskulaturen
- minskad vilja till rörelse
- karaktärsförändring
- matsmältningsproblem

Fodringsanvisning

Ca 5 g per 100 kg kroppsvikt dagligt tillsammans med det dagliga fodret.

Tilldelningens varaktighet beror på bristen av det saknade näringsämnet. Även om det tar månader till år att kompensera för zinkbrist, kan selenbrist vanligtvis kompenseras inom några veckor.

Hästar som har brist på spårämnen kan också utfodras med foder som är särskilt rikt på spårämnen, som Hesta Mix[®], Struktur-E[®] eller NaturMüsli SENIOR.

OBS: Detta kompletteringsfoder har ett högre innehåll av vitaminer och mineraler än ett vanligt kompletteringsfoder och ska därför som mest utgöra 0,4 % av hästens foderstat (inklusive hö). Vänligen följ utfodringsrekommendationen.

1 mått = ca 12 g

EAN: 4042215188032



Hesta Plus Koppar, 1 kg

Sammansättning

Snittat varmluftstorkat alphö, jästprodukter (rik på RNA och nukleotider), sojaflingor hydrotermiskt förbehandlade*, lättkrossade oljefrön (linfrön, solros) 10 %, kallpressade oljor (linfrön, solros) 7 %, ingefära, ättika, cikoriainulin

*tysk soja, lokalt odlad exklusivt för St. Hippolyt

Deklaration

Råprotein.....	16.2 %
Råfett.....	13.2 %
Råfibrer.....	5.2 %
Råaska.....	2.3 %
Kalcium.....	0.17 %
Fosfor.....	0.41 %
Magnesium.....	0.05 %
Natrium.....	0.07 %
Lysin.....	1 %
Metionin + Cystein.....	0.5 %

Spårämnen per kg

Koppar som koppar(II)-glycinchelät-hydrat (fast) 3b413.....	2.500 mg
---	----------

Teknologiska tillsatser

Sedimentär Klinoptilolit 1g568.....	30 mg
Lecithin 1c322i.....	15.000 mg

Udskrevet 12/04/2026



Feeding

like nature™